

# 宣毒发表汤治疗小儿麻疹 106 例

刘百祥 (广东省肇庆铁路医院 肇庆 526020)

刘常春 (湖南省茶陵县人民医院 412400)

麻疹是儿科常见的急性呼吸道传染病,临床以发热、呼吸道卡他症状、麻疹粘膜斑及皮肤暗红色斑丘疹为其特点。我们自 1988 年至 96 年 10 月应用宣毒发表汤治疗本病 106 例,疗效肯定,特报告如下。

**1 临床资料** 106 例患者,为门诊及住院病例,年龄为 2 岁~14 岁,其中男性 59 例,女性 47 例,并发肺炎者 36 例。病程 3d~7d 不等。

**2 诊断标准** 具有发热、咳嗽、鼻塞流涕、泪水汪汪、全身布发红色疹子等症状,查见耳后、发际、颈部皮肤潮红、眼睑红赤,口腔粘膜

粗糙,上腭、颊部、咽部、舌尖见到红刺好似麦芒般大小的红点,口腔两颊粘膜可见麻疹粘膜斑,与麻疹患者接触史。

## 3 治疗方法

**3.1 一般治疗** 临床上以宣毒发表汤治疗,药物由升麻、葛根、前胡、枳壳、荆芥、防风、杏仁、木通、连翘、牛蒡子、桔梗、淡竹叶、薄荷、甘草组成。根据年龄调整用药剂量。以水煎服,每日 1 剂,并注意保暖,忌食油腻、辛辣、生冷食物。

**3.2 逆证治疗** 临床常见的麻疹逆证有:麻毒闭肺、热毒攻喉、邪陷心肝等,这里只讨论

麻毒闭肺的证治。症状常见高热不退,咳嗽气促,鼻翼煽动,疹点不多,或疹见早回,或疹点密集色紫,舌质红,苔黄,脉数。用宣毒发表汤合麻杏石甘汤治疗。

#### 4 治疗结果

**4.1 疗效标准** 治愈:热退,疹出顺畅,手心、足底、鼻准部都见疹点。有效:潮热,疹点出现,尚未出齐。无效:发热不退,疹闭不出。

**4.2 治疗结果** 服药 1 剂,治愈 36 例,占 33.96%,服药 3 剂,治愈 59 例,占 55.66%,服药 5 剂,治愈 11 例,占 10.38%,总有效率 100%。

**5 病案举例** 杨×,男性,14岁,1993年11月3日初诊。发热、咳嗽 5d,伴气促,口渴烦躁 2d,当地用青霉素治疗 3d。与麻疹患儿接触史。查体:腋温为 39.2℃,耳后、颈部皮肤潮红、眼结膜充血,口唇粘膜粗糙,咽充血,扁桃腺不大,双肺呼吸音增粗,肺底少许湿罗音,舌质红,苔薄黄,脉数。WBC 为  $14.0 \times 10^9/L$ , N0.84, L0.16, X 线检查报告为“肺炎”,拟诊为“麻疹并肺炎”(麻毒闭肺),投以宣毒发表汤合麻杏石甘汤治疗,3 剂,疹出,热退,咳喘减轻,去麻黄、石膏、继服 3 剂,诸

症改善,以沙参麦冬汤善后。

#### 6 讨论

麻疹主要由于感受麻毒时邪,流行传染所致,治疗原则宜宣透解毒为先,养阴清热善后,不宜早投寒凉,否则“冰伏毒热,则必不能出透,多致毒气内攻,喘闷而毙。”(《医宗金鉴·痘疹心法·疹门》)。宣毒发表汤出自《痘疹仁端录》,主要起疏风解表,宣毒透疹和止咳化痰作用。本方对于麻疹欲出不出,身热无汗,咳嗽咽痛,烦渴尿赤者治疗效果肯定。

麻毒闭肺是麻疹最常见的逆证之一,多因调护不当,麻毒炽盛,闭郁于肺所致,以宣毒发表汤合麻杏石甘汤,取麻黄宣肺平喘,石膏清热生津,共奏宣肺透疹,清热解毒,利咽祛痰之效。

现在由于麻疹疫苗已被广泛应用,临床所见的麻疹大都症状不典型,一般症状轻,发热不高,上呼吸道症状亦不明显,皮疹稀疏,甚至见不到麻疹粘膜斑,病程也短,应注意询问既往病史和预防接种史,要及时发现和治理,防止漏诊和误诊。

(收稿:1997-10-10)