

中西医结合治疗良性骨肿瘤的临床观察

兰海^{1*}, 王辉², 刘博¹

(1. 山东省威海市立医院, 山东 威海;

2. 山东省威海市立第二医院, 山东 威海 264200)

良性骨肿瘤分为良性成骨性肿瘤, 成软骨性肿瘤, 脉管肿瘤, 其他结缔组织肿瘤等。西医治疗以手术为主。中药治疗可以提高机体机能, 并且避免化学药物对人体的损害。如中药补中益气汤可以提高病人的免疫力, 改善循环, 利于病

人的临床治疗和恢复。我们观察补中益气汤配合西医治疗良性骨肿瘤的临床效果。现报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 2002年3月~2006年5月期间来我科就诊的(30~50)岁、血钙在正常范围的良性骨肿瘤患者。其临床表现为肢体或躯干的异常隆起, 肿块生长缓慢, 无压痛或轻压痛, 无全身症状; X线检查肿块界限清楚, 无转移, 无骨膜反应; 组织学检查显示细胞形态分化成熟, 近乎正常排列; 化验检查无异常^[1]。经临床、X线及病理3方面综合分析, 确诊51名为良性骨肿瘤患者。随机分成3组, 每组17名。3组之间的年龄、性别差异无显著性。

1.2 治疗方法 患者先经手术彻底局部刮除植骨或切除骨肿瘤组织后, 伤口外敷纱布。术后3组病人分别给予补中益气汤、钙尔奇D以及钙尔奇D和补中益气汤合并治疗。钙尔奇D1片/d。补中益气汤组成: 党参、黄芪、炒白术、当归、山茱萸、柴胡、升麻、陈皮、桂枝、川芎、乌药^[3]。按照《中医骨病

(下转第41页)

[收稿日期] 2008-09-04

[通讯作者] * 兰海, Tel: (0631) 5224816

(上接第 27 页)

学^[2]将骨肿瘤分为寮阻实证、毒热炽盛、肝肾亏虚、气血不足等证型并给予不同的补中益气汤:寮阻实证减当归,加茯苓;毒热炽盛去党参,加丹皮;肝肾亏虚加六味地黄丸;气血不足不变。服用方法:用水 300 mL,煎至 150 mL,去渣,每天 1 剂空腹时稍热服。中西药治疗组同时给予不同的补中益气汤和钙尔奇 D 进行治疗。疗程 6 个月。

1.3 疗效标准 治愈:6 个月内患者正常工作生活,X 线显示无肿块;好转:6 个月内患者恢复较好,X 线显示无肿块;无效:患者 X 线显示还有肿块。

1.4 统计学处理:采用多组等级资料的秩和检验方法,以 $\alpha = 0.05$ 为检验水准。

2 治疗结果

各组总疗效比较,结果见表 1。

表 1 3 组总疗效比较

组别	疗效			合计
	治愈	好转	无效	
西药组	3	14	0	17
中药组	3	13	1	17
中西药组	7	10	0	17
合计	13	37	1	51

多组等级资料的秩和检验 $H_c = 16.43, P < 0.05$ 。表示 3 组之间至少有两组之间的差别有统计学意义。经过多重比较显示:西药组和中药组之间差别无统计学意义, $P > 0.05$;中西药组与西药组间比较, $P < 0.05$, 差别有统计学意义。中西药组与中药组比较, $P < 0.05$, 差别有统计学意义。故可认为中西药治疗比单纯使用钙尔奇 D 或者补中益气汤疗效更

好。

3 讨论

骨肿瘤是发生于骨骼或其附属组织(血管、神经、骨髓等)的肿瘤,其确切病因不明。骨肿瘤有良性和恶性之分。临床上良性骨肿瘤多见,一般术后不易复发,预后良好。我们的研究表明:补中益气汤合并钙尔奇 D 应用于良性骨肿瘤术后治疗取得良好的疗效。补中益气汤用药特点:黄芪补中益气、升阳固表,人参、白术、炙甘草甘温益气、健脾益胃,陈皮理气行滞,升麻、柴胡协同黄芪、人参升举下陷之阳气,当归补血和营,7 药合用,共奏补气升阳、甘温除热之功^[3]。补中益气汤应用于骨肿瘤的术后调理,能调节机体免疫功能,改善人体多项机能,利于术后恢复。而钙尔奇 D 则能够促进钙、磷在肠内的吸收,并促进骨骼的正常钙化,增强骨密度。二者联合应用,治标更治本,促进了骨肿瘤患者的康复。

中医理论准确辨证切合病机,并能根据不同病情,灵活掌握方药的加减化裁,取得很好的疗效。西医充分利用各种检测手段来认识骨肿瘤。进行西医治疗能够根治骨肿瘤,抗感染,促进伤口愈合,促进功能的恢复。中西医结合治疗综合了上述两种优势,加快了骨肿瘤的治愈、好转。

[参考文献]

- [1] 李德林,孙文举. 浅谈骨肿瘤的诊断及鉴别诊断[J]. 中华医学实践杂志. 2006, 5(7): 17-19.
- [2] 蒋位庄,王和鸣. 中医骨病学[M]. 北京:人民卫生出版社, 1990: 270-275.
- [3] 毛智,魏科锋. 补中益气汤临床应用概况[J]. 江苏中医药. 2004, 25(3): 56-58.