

• 临床 •

清宫胶囊治疗药物流产后出血时间延长临床观察

宋 华, 张利斌, 刘全美

(山东省鱼台县中医院, 山东 鱼台 272300)

摘要:目的: 观察清宫胶囊治疗药物流产后出血时间延长临床疗效, 比较两组疗效。方法: 治疗组口服清宫胶囊, 对照组口服宫血宁胶囊。结果: 治疗组明显优于对照组 $P < 0.5$ 。结论: 清宫胶囊治疗药物流产后出血时间延长有一定的临床疗效。

关键词: 清宫胶囊; 药物流产; 出血时间延长; 中医药疗法

中图分类号: R283.6 文献标识码: B 文章编号: 1005-9903(2005)06-0070-02

采用米非司酮配伍米索前列醇药物流产, 使要求终止早孕妇女易于接受。但由于在孕囊排出后, 仍有部分蜕膜或绒毛滞留在宫腔, 使出血时间延长, 出血增多。于 2000 年 9 月~ 2004 年 3 月本院中医妇科门诊, 开展了以清宫胶囊治疗并临床观察。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 参照《中药新药临床研究指导原则》^[1], 《妇产科急症学》^[2] 拟定: (1) 停经 49 天以内, 经妇科检查, 尿妊娠试验测定及 B 超检查证实为宫内妊娠的健康早孕妇女, 并要求药物流产者。口服米非司酮每次 25mg, 空腹 12 小时一次, 共 6 次, 第三天空腹顿服米索前列醇 600mg。孕囊排出; (2) 出血时间 > 14 天; (3) 出血量 > 2 倍月经量; (4) B 超检查提示宫腔内组织残留; (5) 腹痛。其中(1)、(2)项为必备条件; (3)、(4)、(5)项中有 2 项符合者可确诊。

1.2 一般资料 随机分为治疗组和对照组。治疗组 256 例, 年龄 18~ 38 岁, 其中 18~ 23 岁 116 例, 24~ 30 岁 95 例, 31~ 38 岁 45 例; 出血量 > 2 倍月经量 < 3 倍月经量 189 例, > 3 倍月经量 67 例; B 超示宫腔内组织残留 189 例; 出血时间 14~ 49 天, 其中 < 30 天 181 例, > 30 天 75 例。对照组 65 例, 年龄 18~ 39 岁, 其中 18~ 23 岁 28 例, 24~ 30 岁 24 例, 31~ 39 岁 13 例; 出血量 > 2 倍月经量 < 3 倍月经量 47 例, > 3 倍月经量 18 例; B 超示宫腔内组织残留 39 例; 出血时间 14~ 48 天, < 30 天 46 例, > 30 天 19 例。两组情况基本一致, 具有可比性。

1.3 排除标准: (1) 不符合药物流产后出血时间延长的诊断标准。(2) 经检查为生殖器官器质性病变(子宫肌瘤、子宫腺肌病、垂体肿瘤等)引起的出

血时间延长者。(3) 合并有心血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病及精神病患者。(4) 过敏体质或对多种药物过敏者。

1.4 治疗方法 治疗组 清宫胶囊由人参 6g、阿胶 10g、当归 10g、红花 10g、枳壳 10g、三七 10g、怀牛膝 10g、血竭 5g、益母草 10g、莪术 10g、血余炭 6g, 11 味中药组成。由本院制剂室按《中华人民共和国药典》^[3] 提取浓缩赋型, 装 0 号胶囊, 每粒重 0.4g(含生药 1.5g)。每日 3 次, 每次 6 粒, 温开水送服, 7 天为 1 疗程。对照组宫血宁胶囊, 生产企业: 云南白药集团股份有限公司。本院药房取药。每日 3 次, 每次 2 粒, 温开水送服, 7 天为 1 疗程。

2 结果

疗效判定标准。显效: 治疗 1 个疗程血止者; 有效: 治疗 2 个疗程血止者; 无效: 治疗 2 个疗程仍血流不止或放弃治疗者。结果: 治疗组与对照组分别为: 显效 163 例(63.67%), 19 例(29.23%); 有效: 75 例(29.30%), 31 例(47.69%); 无效: 18 例(7.03%), 13 例(23.08%)。治疗组总有效率 92.97%, 对照组总有率 76.92%。临床用药中没有发生不良反应。

3 讨论

口服米非司酮终止早孕已广泛用于临床, 但仍存在着子宫出血时间延长, 出血量增多的问题, 其主要原因是妊娠产物排出不全。中医理论认为, 流产可造成冲任胞宫受损, 气虚不能摄血, 胞衣滞留, 瘀血阻滞于胞宫, 新血不能化生归经, 故出血淋漓不断, 属于产后恶露不绝或不完全流产的范畴。本方以人参大补气而摄血; 阿胶具有补血止血的功效; 怀牛膝、红花、莪术有抗早孕作用, 配伍组成莪术复方, 则抗早孕作用增强, 毒性较低^[4]; 枳壳、益母草有兴奋子宫, 使子宫的收缩幅度增加^[5], 血余炭有止血、抑菌作用^[6]; 三七、血竭活血止痛止血; 当归具有

补血、活血、止痛的功效;诸药合用,补气摄血、补血、活血祛瘀、止血。共达瘀祛新生,胞宫恢复,血止正安。

参考文献:

- [1] 郑筱萸,任德权,曹文庄,等.中药新药临床研究指导原则[S].北京.中国医药科技出版社.2002.238.
- [2] 徐增祥,杨辛,盛韵姑,等.妇产科急症学[M].第二版.北京.人民军医出版社.2004.50.

- [3] 国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].北京:化学工业出版社,2000 附录 8,70.
- [4] 陈梓璋,胡尧碧,肖铭玉.莪术复方和单味莪术的抗早孕作用及毒性的比较[J].中草药,1982,13(5):32.
- [5] 蔡永敏,任玉让,王黎,等.最新中药药理与临床应用[M].北京:华夏出版社,1999,238.319.
- [6] 覃元.血余炭的研究简况[J].中国中药杂志,1989,14(1):24.