

对河南周口产梅子的名实考证

范磊 (沈丘县人民医院, 河南 沈丘 466300)

在近几年的药剂工作中,经常发现以本地产梅子(又称梅杏)加工炮制作乌梅用。该品种炮制后肉质厚软味极酸,很似正品乌梅,五十年代医药系统曾安排过生产,至今当地仍有药用习惯。为了考查本地产的梅子到底是梅还是杏,药用价值如何,我们做了如下比较试验。

1 性状来源

梅子,又称梅杏,河南周口产,为蔷薇科植物,其小枝棕色,新稍红褐;叶片中大,叶脉红褐色。单锯齿,浅而整齐。果实稍扁圆,中等大小,单果重50g缝合浅深,果实具短茸毛。果皮成熟后橙黄色,阳面黄色,肉厚粘核,多汁,味酸甜。青时味极酸。果核扁形(似山杏),基部略偏斜,表面呈细网状,核有锋利边缘。与产于西安的梅杏果皮厚韧易剥离不同。五十年代日本专家菊池秋雄先生来我省考察时认为本种是李的一个变种。根据他的意见,以往的教材中把它归为杏李(说称红杏,秋根子 *Prunus sumoni* Carr),在新编的《果树栽培学》中对此有争议,目前尚无学名。

2 显微鉴别

乌梅与其混淆品杏与山杏,苦李,河南周口产梅子的显微特征区分如下:

- ① 部分外果皮分化成非腺毛。
- ② 非腺毛基部为圆形……乌梅。
- ③ 非腺毛基部膨大成头状三角形,可见壁孔和孔沟。
- ④ 表皮细胞中有的可见念珠状增厚的横隔……杏或山杏。

⑤ 果皮细胞无非腺毛,表皮细胞中可见念珠状增厚的横隔,种皮石细胞淡黄色,孔沟深且明显……苦李子

梅子(梅杏)的表皮细胞有的可见念珠状增厚的横隔似苦李子,但又具有苦李子没有的非腺毛,非腺毛基部膨大成头状三角形,而不是圆形,所以不同于梅而类似杏或山杏。梅杏同时具有杏和李的显微特征。

3 理化鉴别及含量测定

3.1 定性反应 取干燥果肉各2g,另乙醇1.5ml,研磨滤过。(1)取滤液各2ml于水浴蒸干,加入新制的吡啶:醋酐(3:1)液约3mL。(2)取滤液各1mL,加浓盐酸4~5滴及少量锌粉,在沸水中热3min,结果见下表:

试剂	乌梅	梅子(梅杏)	杏或山杏	苦李子
吡啶-醋酐	紫棕色	橙红色	橙红	淡黄色
盐酸-锌粉		淡黄色		红色

3.2 含量测定的比较 取乌梅,梅子粗粉各4g(同时按照中国药典的方法测定其水分),精称,置锥形瓶中,精密加水100mL,回流4h,放冷、滤过、弃去初滤液,精密量取续滤液20mL加水至80mL,测其pH值乌梅为3.4,梅杏为3.8,然后,照电位滴定法,用0.1055mol/L的NaOH溶液滴定,结果为:乌梅枸橼酸含量为38.30%,梅杏为12.61%。

4 小结与讨论

通过比较可知:河南周口产梅子(又称梅杏),不同于蔷薇科植物梅 *Prunus mume*(Sieb et Zucc)的果实,其成熟炮制加工品与乌梅酸性大小相差无几,但枸橼酸含量相差较大,能否代乌梅使用还需要药理和临床上的探讨。

性状,显微比较中可以看出河南周口产梅子(梅杏)同时兼有杏和李的显微特征,并以杏的特征为主。为此笔者比较赞同将其看作杏与李的自然杂交种这一观点,将其看作李的变种是不够确切的。

内服外用首乌润肤饮治疗老年性皮肤瘙痒症42例

张荣沐¹,房帅²,李淑兰¹

(1 齐齐哈尔医学院附属二院, 黑龙江 齐齐哈尔 161006;

2 齐齐哈尔市第一医院, 黑龙江 齐齐哈尔 161000)

笔者自拟首乌润肤饮内服兼外用治疗老年性皮肤瘙痒症42例报道:

1 临床资料

观察对象均为门诊患者。本组42例中,男24例,女18例;年龄51~72岁,平均63.7岁;病程12天~8年,平均4.2年。所有病例根据《皮肤病学》^[1]对老年性皮肤瘙痒症诊断标准,确诊为老年性皮肤瘙痒症。所有患者血、尿常规均在正常范围内,尿糖均为阴性,均排除感染性疾病、糖尿病、神经衰弱、肾肝胆疾患及内脏肿瘤等疾病。

2 治疗方法

首乌润肤饮组成:首乌30g,阿胶、丹参、苦参、地肤子各15g,刺蒺藜20g,黄芪、党参、熟地、麦冬、当归、赤芍、防风、浮萍、甘草各10g。每日1剂,水煎二次滤汁,分早晚两次温服,余下药渣热浴(或囟热敷局部痒甚处)。1周为1个疗程,治疗2~3个疗程后进行疗效评价。

3 治疗结果

临床治愈(瘙痒消失,2周以上未复发者)21例;好转(瘙痒明显减轻)18例;无效(用药1周瘙痒无明显改善者)3例;总有效率92.8%。随访2~18个月,除3例复发外,其余疗效

巩固,复发病例再予首乌润肤饮治疗仍有效,所有病例未见任何不良反应。

4 病案举例

杨某,男,62岁,1999年5月9日诊。患皮肤瘙痒4年,每于冬季频发,春秋偶发,夏季极少发作,发则短暂轻微。阵发性瘙痒,每于晚间加重,因瘙痒而失眠,皮肤搔破,苦不堪言。诊见形瘦神疲,周身皮肤抓痕,血痂、色素沉着俱存,舌淡红、少津、无苔,脉沉细弦。证为血虚瘙痒。西医诊断为老年性皮肤瘙痒症。嘱用首乌润肤饮,如法内服外用。

5 体会

老年性皮肤瘙痒证中医称之为“痒风”,多因血虚风燥,

肌肤失养所致。气血相互依存,气虚血运受阻,故患者皮肤干燥、肥厚、瘙痒。方中首乌、阿胶、熟地、麦冬、赤芍滋阴益精养血;党参、黄芪健脾益气固表;丹参、当归养血活血;防风、刺蒺藜、苦参、地肤子疏风除湿止痒;浮萍穿透表里,疏散风邪,全方共奏益气固表、疏风止痒之功。从而消除皮肤干燥,达到止痒效果。药渣热浴(或热敷)可促进皮肤血液循环,营养肌肤,疏风止痒,使药直达病所,提高临床疗效。

参考文献:

- [1] 杨国亮. 皮肤病学[M]. 上海: 医科大学出版社, 1992. 468.