

# 吸毒成瘾者性功能调查及回生胶囊 改善其性功能的临床研究

陈和亮, 陈通文(广东珠海市中医院, 珠海 519015)

**摘要:** 目的: 调查吸毒成瘾者性功能及回生胶囊改善其性功能的临床研究。方法: 60 份病历随机分为治疗组和安慰组对照各 30 份, 对其性欲、阴茎勃起、阴茎硬度、性快感、射精时间进行临床观察。结果: 吸毒成瘾者性欲下降, 性快感减弱, 阴茎勃起硬度减低, 射精时间延迟。治疗组与安慰组在对其性欲、阴茎硬度、性快感方面均有显著性差异( $P < 0.05$ )。结论: 中药回生胶囊具有改善吸毒成瘾者的性功能的作用。

**关键词:** 回生胶囊; 吸毒成瘾; 性功能

中图分类号: R247.9 文献标识码: D 文章编号: 1005-9903(2000)05-0056-02

该课题是广东省卫生厅“五个一科教兴医工程”重点项目中一部分。在 1996 年 7 月至 1998 年 4 月在珠海市公安局看守所对 60 例强制戒毒恢复期人员进行强制性临床观察。

## 1 一般情况

**1.1 病历选择** 珠海市公安局强制戒毒所劳教人员, 入戒毒所已戒毒 20 天以上, 属于戒毒后恢复期者。

**1.2 排除病例** 年龄大于 60 岁, 小于 16 岁, 用海洛因类毒品少于 2 个月。既往有慢性心、脑、肺、肾、胰内分泌及代谢性疾病, 有服用激素类药物史, 有免疫系统、生殖系统、遗传性疾病和严重传染病史。

**1.3 分组情况** 将 60 例符合病历选择标准者随机分为两组, 第一组回生胶囊治疗组, 共 30 例, 男 16 例, 女 14 例; 第二组为空白对照组, 男 17 例, 女 13 例, 共 30 例。两组病人年龄、文化程度、职业、吸毒方法、婚姻等一般情况, 经  $X^2$  检验均  $P > 0.05$ , 统计学处理无组间差异。

## 2 药物、用法、疗程

治疗组即回生胶囊组, 用回生胶囊。该胶囊由下列药物组成: 红参 15g、仙茅 15g、竹茹

10g、黄芪 30g、山萸肉 15g、丹参 20g、淫羊藿 25g、白芍 15g、升麻 10g、巴戟天 15g、紫花地丁 15g。

经现代工艺提取, 浓缩制成胶囊。每粒胶囊重 0.45g, 每粒胶囊相当于生药 5g。该方法具有补气益肾、养血和血, 佐以解毒化痰。每次 4 粒, 日三次, 三个月为一疗程。治疗组服一疗程, 对照组给予淀粉胶囊 4 粒/次, 3 次/日, 三个月为一疗程。(每天服药均在警察监视下进行)

## 3 治疗前后的性功能情况

**3.1 两组性欲的比较(男女)** 结果见表 1。由表 1 可见, 治疗前两组统计学处理没有差异, 治疗后回生胶囊组性欲功能恢复明显, 统计学处理有显著性差异。

表 1 治疗前后两组性欲比较

组别	n	治疗前			治疗后		
		弱	一般	强	弱	一般	强
安慰对照组	30	18	10	2	15	10	5
回生胶囊组	30	19	11	0	4	6	20

注: Redit 检验  $P < 0.05$ (下表同)

**3.2 两组阴茎勃起的比较(男)** 结果见表 2。由表 2 可见, 治疗前两组统计学处理没有差异, 治疗后回生胶囊组阴茎勃起功能恢复明显, 统计学处理有显著性差异。

表2 治疗前后两组阴茎勃起比较

组别	n	治疗前			治疗后		
		不易勃起	刺激后能勃起	有欲即能勃起	不易勃起	刺激后能勃起	有欲即能勃起
安慰对照组	16	8	8	0	5	6	5
回生胶囊组	17	8	9	0	0	0	17

### 3.3 两组阴茎硬度的比较(男): 结果见表3。

表3 治疗前后两组阴茎硬度比较

组别	n	治疗前		治疗后	
		勃而不坚	满意	勃而不坚	满意
安慰对照组	16	13	3	11	5
回生胶囊组	17	11	6	7	10

由上表可见, 治疗前两组统计学处理没有差异, 治疗后回生胶囊组阴茎硬度恢复明显, 统计学处理有显著性差异。

### 3.4 两组性快感比较(男女): 结果见表4。

表4 治疗前后两组性快感比较

组别	n	治疗前		治疗后	
		弱	可以	弱	可以
安慰对照组	30	28	2	24	6
回生胶囊组	30	26	4	5	25

由上表可见, 治疗前两组统计学处理没有差异, 治疗后回生胶囊组快感恢复明显, 统计学处理有显著性差异。

另: 绝大多数吸毒者射精时间延迟。

通过60个戒毒恢复期男女调查, 他(她)

们的性欲低下, 很难勃起, 阴茎勃起硬度亦不足(多表现为勃而不坚), 绝大多数性快感弱, 射精延迟。通过服回生胶囊3个月后, 他(她)的性功能绝大多数都得到提高与恢复, 表现性欲增强、易于勃起、硬度增加、快感上升。

## 4 讨论

通过临床观察与调查提示, 吸毒者性功能低下, 中药回生胶囊可恢复吸毒者的性功能。另外通过体质调查: 吸毒成瘾戒毒期患者多存在眼眶发黑、皮肤暗黄欠光泽而粗糙、面色暗滞、大便干、疲乏无力、注意力不集中、体瘦、健忘、自汗心悸、腰酸、性欲低下、不易勃起等症。阿片素毒品辛香、苦、酸涩、性温、有毒。辛香走窜、苦涩燥烈, 最能伤阴耗气。吸时以其辛香开泄气道, 振奋精神, 造成损津耗液, 伐伤气血; 久则成瘾, 靠阿片提携元气, 使之运行先度, 导致元气耗竭, 脏腑俱损。根据病因与常见症, 该类人共有的病理体质是气虚血滞、阴精亏损、兼痰热未尽。而其性障碍亦是由此而致。当然亦与吸毒者长期过度毒品刺激, 造成大脑与性神经疲劳有关。

回生胶囊中红参、北芪、淫羊藿、仙茅、巴戟天、山萸肉, 大补元气, 益气补肾精以兴阳; 丹参、白芍、山萸肉, 养血和气、配合参芪以达生血, 行血之功; 竹茹、升麻、紫花地丁, 清热解毒、荡涤余邪、祛痰养心。连服三月正气得复, 余邪得清, 气血得充, 肾精得盈, 宗筋通泰; 病理体质得以纠正, 故性功能得以康复。